

## Состав и форма выпуска

Капсулы, в упаковке 40 штук.

1 капсула Келтика Форте содержит:

*Активные вещества:*

- 50 мг Уридин 5-монофосфат, динатриевая соль
- 0,003 мг цианкобаламин
- 0,4 мг фолиевой кислоты

*Вспомогательные вещества:* кислота лимонная, натрия цитрата дигидрат, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил 200), маннитол.

*Желатиновая капсула:* железа оксид черный (E 172), титана диоксид (E 171), индигокармин (E 132), желатин.

## Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие. Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы.

## Фармакологические свойства

Келтикан Форте является комбинацией двух нуклеотидов - цитидинмонофосфата и уридинмонофосфата. Эти нуклеотиды присутствуют в организме, поэтому не представляется возможным провести типичное фармакокинетическое исследование.

## Фармакодинамика

Келтикан Форте обеспечивает организм фосфатными группами, необходимыми для объединения моносахаридов с керамидами для формирования нервных оболочек, и фосфатидными кислотами, составляющими сфингомиелин и глицерофосфолипиды - основные компоненты миелиновой оболочки. Таким образом, обеспечивается устойчивый трофический эффект, более полное созревание и регенерация аксональных нервных волокон. В результате чего уменьшается воспаление и нормализуется чувствительность поврежденного участка аксона, что способствует восстановлению аксонального транспорта.

## **Показания к применению**

- радикулиты (люмбаго, люмбалгия, люмбоишиалгия)
- диабетическая полиневропатия
- алкогольные полиневриты
- опоясывающий лишай, ганглионит
- воспаление тройничного нерва, невралгия лицевого, тройничного, межреберных нервов
- плекситы.

## **Способ применения и дозы**

Келтикан капсулы принимают перорально.

Взрослые: по 1 капсуле 1 раз в сутки. Келтикан Форте можно принимать до или после приема пищи. Рекомендованная продолжительность курса лечения — не менее 10 дней. При необходимости прием капсул может быть продолжен на 20 дней, если врач считает это необходимым.

## **Побочные действия**

Не было описано.

Возможно проявление аллергических реакций, в случае проявления каких-либо нежелательных явлений, следует приостановить прием и обязательно обратиться к врачу.

## **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к препарату
- детский возраст до 18 лет

## **Лекарственные взаимодействия**

Не установлено.

## **Беременность и период лактации**

Применение препарата в период беременности и лактации не противопоказано, но целесообразность приема и дозу лекарственного средства устанавливает врач, в зависимости от преимущества пользы от применения над потенциальным риском для плода/ребенка.

## **Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами**

Келтикан Форте не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и выполнения работ, связанных с необходимостью концентрации внимания.

## **Передозировка**

В связи с низкой токсичностью препарата передозировка маловероятна.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

## **Срок хранения**

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска из аптек**

По рецепту.